


Proposition de composition



Emprise par rang

2-3 mètres

(En fonction de la taille latérale pratiquée)

Plantation

Entretien


Subsides

Espèces	Insectes auxiliaires attirés										Capacité d'accueil	Exigence stricte ¹
	Acarions prédateurs (Phytoséiides)	Araignées prédatrices	Carabes	Chrysopes et hémérobes	Coccinelles	Micro-guêpes parasitoïdes	Mouches (Syrphes)	Punaises prédatrices (Anthocorides)	Punaises prédatrices (Mirides)	Thrips prédateurs		
Aulne glutineux [®]	•	•	•	•	•		•	•		•		Hu
Saule blanc [®]				•	•			•				Hu
Charme	•	•		•	•	•		•				
Aubépines [®]				•		•	•					
Merisier [®]	•			•	•		•					
Tilleul petites feuilles [®]	•	•		•	•	•		•	•			
Sureau noir [®]	•	•		•	•	•	•					
Noisetier [®]	•			•	•	•	•	•	•			
Lierre grimpant [®]	•			•			•					

Il s'agit ici d'une situation de grandes cultures. En maraîchage et en arboriculture, il est possible de retrouver d'autres auxiliaires et ravageurs. (Plus d'infos [ici](#))

1. **Ca**: besoin d'un sol calcaire; **Ac**: sol acide; **Hu**: sol humide; **Sec**: sol sec.

INTÉRÊTS



VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Lierre grimpant au pied des saules et charmes

Objectifs