


Proposition de composition



Emprise par rang

2-3 mètres

(En fonction de la taille latérale pratiquée)

Plantation

Entretien

Subsides

Espèces	Période de fructification												Exigence stricte ¹	Abri ²	
	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc			
Merisier ^{gr}						•	•								
Cerisier à grappes ^{gr}						•	•	•							
Framboisier ^{gr}						•	•	•	•	•					
Sureau noir ^{gr}							•	•	•						
Bourdaie ^{gr}							•	•	•	•					
Genêt à balais ^{gr}								•	•						Ac
Noisetier ^{gr}								•	•	•					
Sorbier des oiseleurs ^{gr}								•	•						
Aulne glutineux									•	•					Hu
Aubépines ^{gr}									•	•					E
Chêne sessile									•	•					M
Eglantier ^{gr}	•								•	•	•	•			E
Prunelier ^{gr}										•	•	•			E
Viorne obier ^{gr}	•	•						•	•	•	•	•			
Lierre grimpant ^{gr}	•	•	•	•	•								•		P

• En gras, les espèces fournissant une excellente nourriture pour les frugivores.
 • Vigilance avec le cerisier à grappes qui est également l'hôte du puceron des céréales.

1. **Ca**: besoin d'un sol calcaire; **Ac**: sol acide; **Hu**: sol humide; **Sec**: sol sec.
 2. E= épineux ; P = persistant (feuillage vert toute l'année) ; SP = semi-persistant (les feuilles tombent en partie) ; M = marcescent (les feuilles flétrissent mais ne tombent pas).


VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Lierre grimpant au pied des aubépines et noisetiers
- En prairie pâturée : remplacer les framboisiers par d'autres arbustes pour renforcer l'effet clôture

ESPÈCES POUR UNE HAIE BASSE (MAXIMUM 4M DE HAUTEUR)

Bourdaie, églantier, framboisier, genêt à balais, prunelier, viorne obier

INTÉRÊTS



Objectifs