


Proposition de composition



Emprise par rang


2-3 mètres
(En fonction de la taille latérale pratiquée)

- Plantation
- Entretien
- Subsides

Espèces	Période de floraison												Potentiel (/5)		Exigence stricte ¹
	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Pollen	Nectar	
Noisetier ^{sp}		•	•	•									■	■	
Saule marsault ^{sp}		•	•	•									■	■	
Cornouiller mâle ^{sp}			•	•									■	■	Ca
Prunelier ^{sp}			•	•									■	■	
Cassissier ^{sp}				•	•								■	■	
Érable sycomore ^{sp}				•	•								■	■	
Groseiller rouge ^{sp}				•	•								■	■	
Merisier ^{sp}				•	•								■	■	
Poirier/pommier sauvage ^{sp}				•	•								■	■	
Aubépine à 1 style ^{sp}					•	•							■	■	
Bourdaie ^{sp}					•	•	•						■	■	
Framboisier ^{sp}					•	•	•	•					■	■	
Châtaignier ^{sp}						•	•						■	■	
Tilleul grandes feuilles ^{sp}						•	•						■	■	Sec
Tilleul petites feuilles ^{sp}						•	•						■	■	
Troène commun ^{sp}						•	•	•					■	■	Ca, Sec
Lierre grimpant ^{sp}									•	•			■	■	
Ronces ^{sp}					•	•	•	•					■	■	

1. Ca: besoin d'un sol calcaire; Ac: sol acide; Hu: sol humide; Sec: sol sec.

INTÉRÊTS



VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Lierre grimpant et ronces au pied des aubépines et saules marsaults
- En prairie pâturée : remplacer les cassissiers, groseilliers et framboisiers par d'autres arbustes pour renforcer l'effet clôture

ESPÈCES POUR UNE HAIE BASSE (MAXIMUM 4M DE HAUTEUR)

Bourdaie, cassissier, cornouiller mâle, framboisier, groseillier rouge, prunelier, troène commun

