


Proposition de composition



Emprise par rang

2-3 mètres

(En fonction de la taille latérale pratiquée)

Plantation

Entretien


Subsides

Espèces	Insectes auxiliaires attirés										Capacité d'accueil	Exigence stricte ¹
	Acarions prédateurs (Phytoséiides)	Araignées prédatrices	Carabes	Chrysopes et hémérobes	Coccinelles	Micro-guêpes parasitoïdes	Mouches (Syrphes)	Punaises prédatrices (Anthocorides)	Punaises prédatrices (Mirides)	Thrips prédateurs		
Chêne pédonculé				
Merisier ^{sp}					
Tilleul petites feuilles ^{sp}			
Aubépines ^{sp}				.		.	.					
Sureau noir ^{sp}					
Aulne glutineux		Hu
Saule blanc ^{sp}				.	.		.					Hu
Charme				
Noisetier ^{sp}			
Cornouiller sanguin ^{sp}			
Érable champêtre ^{sp}			Ca (à neutre)
Lierre grimpant ^{sp}	.			.			.					
Orme champêtre						

Il s'agit ici d'une situation de grandes cultures. En maraîchage et en arboriculture, il est possible de retrouver d'autres auxiliaires et ravageurs. **(Plus d'infos [ici](#))**

1. **Ca**: besoin d'un sol calcaire; **Ac**: sol acide; **Hu**: sol humide; **Sec**: sol sec.

INTÉRÊTS



VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Lierre grimpant au pied des saules et charmes
- En Basse Ardenne : alterner cornouiller sanguin et orme champêtre respectivement avec l'aubépine et le charme, intégrer de l'érable champêtre parmi les têtards

Objectifs