


Proposition de composition



Emprise par rang

2-3 mètres

(En fonction de la taille latérale pratiquée)

Plantation

Entretien

Subsides

Espèces	Période de fructification												Exigence stricte ¹	Abri ²	
	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc			
Merisier [®]						•	•								
Cerisier à grappes[®]						•	•	•							
Framboisier [®]						•	•	•	•	•					
Sureau noir [®]							•	•	•						
Bourdaine [®]							•	•	•	•					
Pommier/poirier sauvage [®]								•	•	•					
Sorbier des oiseleurs [®]								•	•						
Aubépines [®]									•	•					E
Chêne pédonculé/sessile									•	•					M
Eglantier [®]	•								•	•	•	•			E
Prunelier [®]										•	•	•			E
Houx [®]	•	•								•	•	•			P
Viorne obier [®]	•	•						•	•	•	•	•			
Alisier torminal [®]									•	•					
Néflier [®]										•	•	•			Ac
Lierre grimpant [®]	•	•	•	•	•								•		P

• En gras, les espèces fournissant une excellente nourriture pour les frugivores.

• Vigilance avec le cerisier à grappes qui est également l'hôte du puceron des céréales.

1. **Ca**: besoin d'un sol calcaire; **Ac**: sol acide; **Hu**: sol humide; **Sec**: sol sec.2. **E**= épineux ; **P** = persistant (feuillage vert toute l'année) ; **SP** = semi-persistant (les feuilles tombent en partie) ; **M** = marcescent (les feuilles flétrissent mais ne tombent pas).


VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Lierre grimpant au pied des aubépines
- En prairie pâturée : remplacer les framboisiers par d'autres arbustes pour renforcer l'effet clôture
- En Basse Ardenne : possibilité d'intégrer de l'alisier torminal parmi les hauts-jets et du néflier au sein de la haie

ESPÈCES POUR UNE HAIE BASSE (MAXIMUM 4M DE HAUTEUR)

Bourdaine, églantier, framboisier, prunelier commun, viorne obier

INTÉRÊTS



Objectifs