


## Proposition de composition



## Emprise par rang

2-3 mètres

(En fonction de la taille latérale pratiquée)

Plantation

Entretien


Subsides

Espèces	Insectes auxiliaires attirés										Capacité d'accueil	Exigence stricte <sup>1</sup>
	Acarions prédateurs (Phytoséiides)	Araignées prédatrices	Carabes	Chrysopes et hémérobes	Coccinelles	Micro-guêpes parasitoïdes	Mouches (Syrphes)	Punaises prédatrices (Anthorcorides)	Punaises prédatrices (Mirides)	Thrips prédateurs		
Aulne glutineux	•	•	•	•	•		•	•		•		Hu
Chêne pédonculé	•	•					•	•				
Merisier <sup>®</sup>	•			•	•		•					
Tilleul petites feuilles <sup>®</sup>	•	•		•	•	•		•	•			
Aubépines <sup>®</sup>				•			•					
Sureau noir <sup>®</sup>	•	•		•	•	•	•					
Érable champêtre <sup>®</sup>	•	•	•		•	•		•	•			Ca (à neutre)
Saule blanc <sup>®</sup>				•	•			•				Hu
Cornouiller sanguin <sup>®</sup>	•			•	•	•			•			
Charme	•	•		•	•	•		•	•			
Orme champêtre				•	•	•		•	•			
Noisetier <sup>®</sup>	•			•	•	•	•	•	•			
Lierre grimpant <sup>®</sup>	•			•			•					

Il s'agit ici d'une situation de grandes cultures. En maraîchage et en arboriculture, il est possible de retrouver d'autres auxiliaires et ravageurs. **(Plus d'infos [ici](#))**

1. **Ca**: besoin d'un sol calcaire; **Ac**: sol acide; **Hu**: sol humide; **Sec**: sol sec.

INTÉRÊTS



## VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Lierre grimpant au pied des saules et charmes

Objectifs

